

Písomná informácia pre používateľa

RECREOL 50 mg/g krém

dexpantenol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.
- To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je RECREOL a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete RECREOL
3. Ako používať RECREOL
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať RECREOL
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je RECREOL a na čo sa používa

Krém RECREOL obsahuje liečivo dexpantenol, ktoré patrí do skupiny liečiv na liečbu rán a vredov. Dexpantenol sa v tkanivách premieňa na kyselinu pantoténovú. Kyselina pantoténová obnovuje pružnosť kože a podporuje hojenie rán.

Krém RECREOL sa používa ako:

Podporná liečba povrchových poškodení kože rôzneho pôvodu. Pomáha zvlhčovať vonkajšiu vrstvu kože a podporuje hojenie s následnými protizápalovými a protisvrbivými účinkami.

Krém RECREOL sa môže používať u detí, dospievajúcich a dospelých.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete RECREOL

Nepoužívajte krém RECREOL

- ak ste alergický na dexpanthenol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- na rany, ak máte hemofíliu (vrodená porucha zrážania krvi) kvôli riziku závažného krvácania.

Upozornenia a opatrenia

V prípade alergickej reakcie prestaňte krém RECREOL používať.

Krém RECREOL nemá prísť do kontaktu s očami.

Iné lieky a RECREOL

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nie sú žiadne dôkazy o tom, že by krém RECREOL ovplyvňoval účinok iných liekov a naopak.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

So súhlasom vášho lekára môžete krém RECREOL používať počas tehotenstva aj dojčenia. Treba sa vyhnúť nanášaniu tohto lieku na prsia, aby s ním neprišli ústa dieťaťa do kontaktu.

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku dexpanthenolu na plodnosť u ľudí.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Krém RECREOL nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Krém RECREOL obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol, vosk z ovčej vlny (lanolín) a propylénglykol

Cetylalkohol, stearylalkohol a vosk z ovčej vlny (lanolín) môžu vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Tento liek obsahuje propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože.

3. Ako používať RECREOL

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Použitie na kožu.

Ak nie je predpísané inak, krém sa u dospelých a detí nanáša na postihnuté miesto v tenkej vrstve raz alebo niekoľkokrát denne podľa potreby.

Dĺžka liečby závisí od povahy a priebehu ochorenia. Ak sa do 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Použitie u detí

Dexpantenol sa môže používať u detí.

Ak máte pocit, že je účinok krému RECREOL príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb): alergické reakcie, reakcie z precitlivenosti (napr. zápal kože/alergické kožné reakcie a podráždenie kože).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať RECREOL

Tento liek uchováajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Neuchovávajte v mrazničke.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo krém RECREOL obsahuje

- Liečivo je dexpanthenol. 1 g krému obsahuje 50 mg dexpanthenolu.
- Ďalšie zložky sú DL-pantolaktón, fenoxyetanol, cetylfosfát draselný, vosk z ovčej vlny (lanolín), propylénglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, izopropylmyristát, čistená voda.

Ako vyzerá RECREOL a obsah balenia

Homogénny biely alebo žltkastý krém so špecifickým zápachom.

30 g alebo 50 g krému v hliníkovej tube. Tuba je uzavretá hliníkovou membránou a je opatrená bielym skrutkovacím uzáverom. Hliníková tuba v kartónovej škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko tel.: +371 67083205 fax: +371 67083505
e-mail: grindeks@grindeks.lv

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika	Recreol
Estónsko	Recreol
Fínsko	Recreol 50 mg/g kerma
Litva	Recreol 50 mg/g kremas
Lotyšsko	Recreol 50 mg/g krēms

Maďarsko	Recreol 50 mg/g krém
Nemecko	Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Creme
Poľsko	Recreol
Portugalsko	Recreol 50 mg/g creme
Rakúsko	Recreol 50 mg/g Creme
Rumunsko	Recreol 50 mg/g cremă
Slovensko	RECREOL 50 mg/g krém
Slovinsko	Recreol 50 mg/g krema

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2021.